

CONSEJOS DE SEGURIDAD: USO DE OPIOIDES Y CUIDADO DENTAL




Los opioides con receta, un tipo de analgésico, pueden recomendarse para aliviar el dolor dental. Los opioides bloquean las señales de dolor en los nervios y en el cerebro. Este tipo de analgésico puede ser muy adictivo. El dolor dental mejorará cuando el dentista haya solucionado el problema que lo genera. Los medicamentos de venta libre como el ibuprofeno (Advil) y el acetaminofén (Tylenol) son los mejores para aliviar el dolor dental. Hable con su médico o su farmacéutico para saber cuál es el mejor para usted.

Antes de administrarle un analgésico opioide, su dentista debe:

- Preguntarle qué medicamentos está tomando.
- Preguntarle si tiene antecedentes de abuso de alcohol u otras drogas.
- Preguntarle si sus padres o abuelos tienen antecedentes de abuso de alcohol u otras drogas.
- Preguntarle si tuvo algún acontecimiento traumático en la infancia o en la edad adulta.
- Preguntarle si tiene problemas para mantener un trabajo estable.
- Hablarle sobre su nivel de dolor y las opciones para tratar su dolor dental.
- Informarle sobre los riesgos de tomar opioides, incluso si tiene apnea del sueño, está embarazada, consume alcohol o toma otros medicamentos como Xanax, Valium, Ativan o Klonopin.
- Le indicará la cantidad de analgésico que debe tomar cada día y durante cuántos días.
- Se comunicará con usted en 2 o 3 días para preguntarle si el dolor dental está mejorando.

¿Qué hacer con los analgésicos opioides que no se utilizaron?



A menudo, los pacientes se sienten mejor antes de terminar de tomar todos los analgésicos. **No guarde los analgésicos que le hayan sobrado.** Otra persona podría encontrar el medicamento sobrante y usarlo. Un consultorio médico, una farmacia o una estación de policía local pueden ayudarle a deshacerse de los analgésicos que no haya usado.

¿Quién corre más riesgo de tener una sobredosis de opioides?



- Las personas que toman más opioides de lo indicado o que padecen un trastorno por consumo de opioides.
- Las personas que beben alcohol o toman otros medicamentos con opioides.
- Personas que han intentado suicidarse o que tienen trastornos mentales graves.
- Cualquier persona que ya haya sufrido una sobredosis de opioides.

Fuente: CDC.gov/drugoverdose and <https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm529517.htm>



Visite los servicios de salud mental y abuso de sustancias de Oklahoma:

Haga clic aquí

DentaQuest[®]
a Sun Life company